

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ  
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 14 ก.พ. 2558</p>	<p><b>โจัดิตคามโรคเพิ่มรเท่า เหตุสวม'ถุงยาง'ผิด'ไซซ์'</b></p> <p>กรมควบคุมโรคสำรวจคนไทยไม่นิยม'ถุงยางอนามัย' ห่วงสวมผิดไซซ์เสี่ยงติดเชื้อโรค แนะนำวิธีวัดขนาดให้ดูที่ส่วนสูง เกิน 160 ซม. เส้นรอบวงเฉลี่ย 52 มม</p> <p>เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ เนื่องในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ว่าจากการสำรวจทัศนคติความเห็นของประชาชน เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อควบคุมป้องกันโรค (DDC PoII) ครั้งที่ 11 โดยสำรวจประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 3,000 ราย ใน 22 จังหวัด พบว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจการใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 76.8 ลดลงจากปี 2557 (ร้อยละ 86.2) ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 88.6 ไม่เคยใช้ร้อยละ 6.7 เมื่อถามถึงการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ที่ไม่ใช่คู่นอน พบว่าใช้ทุกครั้งร้อยละ 57 ใช้บางครั้งร้อยละ 35.7 และไม่ใช้เลยร้อยละ 7.3 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการแจกถุงยางอนามัยให้เด็กม.ต้นช่วงวันวาเลนไทน์ เป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ถึงร้อยละ 55.4</p> <p>นพ.โสภณแถลงว่า กรมควบคุมโรคและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้พยายามจัดหาถุงยางอนามัยมาตรฐานราคาถูกเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ โดยมีการจัดหาให้ปีละ 55 ล้านชิ้น และพยายามจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดคณะอนุกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ ปี 2558-2563 เนื่องจากประเมินพบว่ากลุ่มผู้ที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ยังใช้กันน้อยมาก</p> <p>"ในเรื่องการติดโรคจากเพศสัมพันธ์นั้น ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้จัดทำข่าวแจกเรื่องดีดีซีโพล เผย ต้องสอนเด็กพก "ถุงยาง" รับวันวาเลนไทน์ และ ห่วงวาเลนไทน์ เด็กมีเช็กส์ไม่ป้องกัน</p> <p>สคร.5 เตือน สวมถุงยางอนามัย ลดเอดส์ ลดโรคไม่ท้อง ได้เผยแพร่ไปยังเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ 2,000 แห่งแล้ว</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและเครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

ปี 2557 ระบุว่า โรคที่พบมากคือ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส หนองใน  
เทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง ทั่วประเทศ  
พบว่าแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มขึ้น 52.69 ต่อประชากรแสนคน ในปี  
2557 จาก 35.89 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2552 และในรอบ 10 ปี  
วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ดิคคามโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเกือบ 5 เท่าตัว จาก  
สัดส่วน 7.53 เป็น 34.89 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 20-29  
เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว โดยคาดว่าในอีก 3 ปี จะมีผู้ป่วยโรคติดต่อทาง  
เพศสัมพันธ์ใน 2 กลุ่มอายุนี้ประมาณ 21,137 คน สาเหตุจากการไม่ใช้  
ถุงยางอนามัย" นพ.โสภณกล่าว

ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา โฆษก สธ. แถลงว่า สิ่งที่น่า  
เป็นห่วงในวัยรุ่นคือการเลือกขนาดถุงยางอนามัยที่ไม่เหมาะสมกับ  
ขนาดอวัยวะเพศของตัวเอง เพราะมีทัศนคติที่ผิดคือ กลัวเพื่อนหยามว่า  
อวัยวะเพศเล็ก ไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นชาย

"เมื่อใช้ถุงยางที่ใหญ่กว่าไซซ์จริง ขณะมีกิจกรรมถุงยางจะหลุด  
หลวม ซึ่งมีความเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรืออาจทำให้คู่นอน  
ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น ในบางรายอาจจะไม่รู้วิธีการวัดขนาด" นพ.สมชาย  
กล่าว และว่า จากผลสำรวจของ สธ.พบว่า ผู้ชายไทยมีขนาดเส้นรอบวง  
อวัยวะเพศ 52 มิลลิเมตร (มม.) 12 ล้านคน ขนาด 49 มม. 6.5 ล้านคน  
ขนาด 54 มม. 3.6 ล้านคน และขนาด 56 มม. 1.2 ล้านคน ส่วนการวัด  
ขนาดอวัยวะเพศนั้นใช้หลักการวัดจากส่วนสูง หากสูงไม่เกิน 160  
เซนติเมตร จะมีขนาดอวัยวะเพศ 49 มม. สูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป 52  
มม. ซึ่งถือเป็นขนาดมาตรฐานของชายไทย