

## ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าง่าย ๆ “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามมอ”

โรคพิษสุนัขบ้า นั้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทุกปี ชื่อของโรคอาจทำให้เข้าใจกันผิด คิดว่าโรคนี้เกิดได้กับสุนัขเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วโรคนี้เกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว หนู กระรอก กระต่าย ลิง ค้างคาว แม้แต่ วัว ควาย ม้า สุกร แต่ในเมืองไทยพบว่า สุนัขเป็นตัวแพร่เชื้อมากที่สุด ซึ่ง 95% ของผู้เสียชีวิต มีสาเหตุมาจากสุนัข รองมาคือ แมว โรคนี้หากเป็นแล้วไม่มีทางรักษา เนื่องจากผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตทุกราย

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคพิษสุนัขบ้าว่า มนุษย์เราสามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการกัด หรือ ข่วน โดยน้ำลายของสุนัขจะเข้าทางบาดแผลที่เป็นรอยถลอก รอยข่วน ซึ่งอาการของสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะพบได้ 2 แบบคือ 1. แบบดุร้าย สัตว์จะมีอาการหงุดหงิด ไล่กัดคนและสัตว์อื่นๆ ถ้าถูกโชหรือกักขังไว้ในกรง จะกัดโช กรง หรือสิ่งของที่อยู่ใกล้อย่างดุร้าย บางครั้งสุนัขจะกัดจนฟันหักหรือลิ้นเป็นแผล มีเลือดออก เมื่อแสดงอาการดุร้ายได้ 2-3 วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซ และตายในที่สุด 2. แบบเชื่องซึม มีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ ลิ้นมีสีแดงคล้ำ และลิ้นห้อยออกมานอกปาก มีอาการคล้ายกระดูกติดคอ โดยเจ้าของมักจะเอามือล้วงแต่ไม่พบกระดูก สุนัขจะเอาขาหน้าตะกุกบริเวณแก้มปากและคอบวม สุนัขแบบหลังนี้จะสังเกตอาการยากมาก ดังนั้น หากสุนัขตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรตัดหัวไปพิสูจน์ก่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี หากถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นพิษสุนัขบ้ากัด ให้รีบล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้งแล้วทาแผลด้วยเบตาดีน แล้วรีบไปพบแพทย์ ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจ ถ้าหากสุนัขไม่ตายให้ขังไว้ดูอาการ 10 วัน ผู้ที่ต้องมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือ ผู้ที่มีบาดแผล ไม่ว่าจะป็นรอยขีดข่วนหรือมีเลือดไหล แผลถลอก หรือแผลลึก ในการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าคือ อย่าไปเล่นกับสัตว์ที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากอาจถูกกัด หรือข่วนได้ ไม่ควรนำสัตว์ที่ป่วยตายทุกชนิดมาฆ่า หละหลวม หรือกินเป็นอาหาร

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่