

ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ **จังหวัดชัยภูมิ** พ.ศ. 2557 (pilot project)
 (Behavioral Risk Factor Surveillance System : BRFSS)
 โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ

	ส่วนที่ 1 การรับรู้สถานะทางสุขภาพ	ชาย % (SE)	หญิง % (SE)	รวม % (SE)
1	ความชุกผู้ที่รายงานว่าสุขภาพตนเองพอใช้หรือสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรงในประชากรอายุ 15-74 ปี	15.9 (2.9)	31.7 (3.2)	23.9 (2.0)
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการ				
2	ความชุกผู้ไปตรวจสุขภาพโดยไม่เจ็บป่วยกับแพทย์, พยาบาล, หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 1 ปีที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	37.8 (3.1)	46.9 (3.6)	42.4 (3.2)
3	ความชุกผู้ไปพบทันตแพทย์ หรือทันตภิบาลเพื่อรักษาเหงือก/ฟันโดยไม่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากครั้งสุดท้ายใน 1 ปีที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	13.6 (2.7)	33.8 (2.9)	23.8 (2.3)
4	ความชุกผู้ที่เมื่อจำเป็นต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาการเจ็บป่วยแต่ไม่ไปเพราะมีปัญหาด้านการเงินและค่าใช้จ่ายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	8.2 (1.3)	6.5 (1.9)	7.3 (1.2)
ส่วนที่ 3 ความตระหนักต่อน้ำหนักตัว ส่วนสูงและเส้นรอบเอว				
5	ความชุกผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (overweight, BMI= 25.0 – 29.9 Kg/m ²) ในประชากรอายุ 15-74 ปี	13.9 (1.5)	31.8 (4.1)	22.9 (2.1)
6	ความชุกผู้ที่มีภาวะอ้วน (obesity, BMI >30 Kg/m ²) ในประชากรอายุ 15-74 ปี	4.7 (1.0)	8.5 (1.8)	6.6 (1.3)
ส่วนที่ 4 กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย				
7	ความชุกผู้มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอในประชากรอายุ 15-74 ปี			
ส่วนที่ 5 การกินผักและผลไม้				
8	ความชุกผู้รับประทานผักและผลไม้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 5 หน่วยมาตรฐาน ภายใน 7 วันที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	69.3 (4.3)	67.8 (3.9)	68.5 (3.4)
ส่วนที่ 6 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ				
9	ความชุกผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันในประชากรอายุ 15-74 ปี	39.5 (2.9)	3.5 (1.9)	21.3 (2.0)
ส่วนที่ 7 การดื่มสุรา				
10	ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัจจุบัน (ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา) ในประชากรอายุ 15-74 ปี	46.3 (4.5)	9.9 (3.2)	28.0 (3.7)
11	ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 30 วันที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	36.4 (4.5)	7.4 (2.9)	21.8 (3.5)
12	ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักภายใน 30 วันที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	12.3 (2.2)	0.3 (0.1)	6.3 (1.0)
13	ความชุกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐานภายใน 30 วันที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	21.6 (5.2)	5.1 (2.4)	13.2 (3.7)
ส่วนที่ 8 ไขมันในเลือดสูง				
14	ความชุกผู้ได้รับการคัดกรองตรวจเลือดหาความผิดปกติระดับไขมันในเลือดภายใน 1 ปีที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	35.9 (5.3)	37.1 (3.8)	36.5 (4.3)
15	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรอายุ 15-74 ปี			

		12.3 (1.7)	21.5 (3.4)	16.9 (2.1)
ส่วนที่ 9 ความดันโลหิตสูง				
16	ความชุกผู้ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตสูงเพื่อคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	60.0 (4.9)	75.6 (2.1)	65.9 (3.1)
17	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15-74 ปี	13.1 (2.3)	12.5 (1.8)	12.8 (1.4)
ส่วนที่ 10 โรคเบาหวาน				
18	ความชุกผู้ที่ได้รับการคัดกรองตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อหาความผิดปกติโรคเบาหวานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15-74 ปี	47.3 (4.2)	47.3 (4.2)	55.1 (3.7)
19	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15-74 ปี	11.2 (1.8)	11.3 (2.8)	11.3 (2.1)
ส่วนที่ 11 โรคเรื้อรัง				
20	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคอัมพฤกษ์หรือหลอดเลือดสมองในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.8 (0.3)
21	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคหัวใจขาดเลือดในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.8 (0.2)
22	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.09 (0.07)
23	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคโลหิตจาง, โรคเลือดจางหรือโรคซิดในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.8 (0.4)
24	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคมะเร็งในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.13 (0.08)
25	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคไตวายเรื้อรังในประชากร อายุ 15-74 ปี	-	-	0.5 (0.3)
26	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคซึมเศร้าในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.2 (0.09)
27	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคตับแข็งในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.06 (0.01)
28	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคพิษสุราเรื้อรังในประชากร อายุ 15-74 ปี	-	-	-
29	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคหัวใจล้มเหลวในประชากร อายุ 15-74 ปี	-	-	0.2 (0.01)
30	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคกระดูกพรุนในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.4 (0.2)
31	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคข้อเสื่อมหรือรูมาตอยด์ ในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	1.8 (0.4)
32	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรคหอบหืดในปัจจุบันในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	1.5 (0.4)
33	ความชุกของผู้ที่ได้รับการบอกจากแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีโรควัน โรคในปัจจุบันในประชากรอายุ 15-74 ปี	-	-	0.4 (0.2)

	ส่วนที่ 12 การบาดเจ็บ			
34	ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถจักรยานยนต์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	18.7 (3.8)	23.7 (2.8)	21.2 (2.7)
35	ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	13.3 (2.8)	18.3 (2.4)	15.8 (2.9)
36	ความชุกการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	27.4 (3.2)	14.6 (2.7)	21.0 (2.2)
37	ความชุกการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งโดยสารตอนหน้าภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	32.6 (3.9)	37.3 (6.5)	34.7(3.1)
38	ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ยานยนต์ (รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์) ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาในประชากรอายุ 15-74 ปี	15.9 (2.2)	3.3 (1.7)	9.5 (1.8)
	ส่วนที่ 13 สุขภาพสตรี			
39	ความชุกสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการตรวจคัดค้านมเพื่อหาก้อนผิดปกติโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล หรือแพทย์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา	-	33.4 (3.4)	-
40	ความชุกสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูก (PAP test) ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา	-	49.4 (4.4)	-