

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
กรณีเริ่มให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือภายในขวบปีแรก

อายุ	วัคซีนที่ให้	ข้อแนะนำ
แรกเกิด	BCG	ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
	HB1	HB1 ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
2 เดือน	DTP-HB1, OPV1	
4 เดือน	DTP-HB2, OPV2	
6 เดือน	DTP-HB3, OPV3	
9 เดือน	MMR1	หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด
1 ปี ครึ่ง	DTP4, OPV4	
	JE1, JE2	ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์
2 ปี ครึ่ง	JE3	
4 ปี	DTP5, OPV5	
7 ปี (ป.1)	MMR2	ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1
	BCG*	1. ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด และไม่มีผลเป็น 2. ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการของโรคเอดส์
	dT, OPV	เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV ไม่ครบ 5 ครั้ง
12 ปี (ป.6)	dT	ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียนชั้น ป.6

กำหนดให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า
กรณีที่พลาดการได้รับวัคซีนในช่วงอายุ 1 ปีแรก

ครั้งที่	ช่วงอายุ 1-6 ปี		ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป		ข้อแนะนำ
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
1	0 (เมื่อพบเด็ก ครั้งแรก)	DTP-HB1, OPV1	0 (เมื่อพบเด็ก ครั้งแรก)	dT1, OPV1	*1. ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด และไม่มีผลเป็น *2. ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการของโรคเอดส์
		MMR		MMR	
		BCG*		BCG*	
2	1	DTP-HB2, OPV2	1	HB1	**ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์
		JE1		JE1, JE2**	
3	2	JE2	2	dT2, OPV2, HB2	
4	4	DTP-HB3, OPV3	7	HB3	
5	12	DTP4, OPV4, JE3	12	dT3, OPV3, JE3	

Immunization schedule

Lao

Vaccine	Age of administration
BCG	At birth
Hep B	At birth
DTPHib HepB	6W , 10W , 14W
OPV	6W , 10W , 14W
TT	0, +1M, +6M, +1Y, +1Y
Measles / MR	9M

Immunization schedule

Cambodia

Vaccine	Age of administration
BCG	At birth
DTP Hip HepB	6W , 10W , 14W
Hep B	At birth
OPV	6W , 10W , 14W
Measles	9M
TT	1st contact , +1M, +6M , +1Y , +1Y
JE (Live attenuated)	10M

Immunization schedule

Myanmar

Vaccine	Age of administration
BCG	6W
DTP	6W , 10W , 14W
Hep B	At birth,6W , 10W , 14W
OPV	6W , 10W , 14W
Measles	9M,18M
TT	1st contact during pregnancy , 1M