



คู่มือ อสม.และ อบต.

## ในการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยูงลาย (ชิคุนกุนยา)

สาเหตุ โรคไข้ปวดข้อยูงลายเกิดเชื้อไวรัส ชิคุนกุนยา

การติดต่อ โดยยูงลาย ทั้งยูงลายบ้านและยูงลายสวน

อาการ ไข้สูง ปวดศีรษะ มีผื่นแดงตามผิวหนัง

ปวด บวม ตามข้อมือ ข้อนิ้วมือ ข้อเท้า เข่า สอก

อาการปวดข้อจะปวดมากกว่าการปวดข้อทั่วไป

บางคนขยับข้อไม่ได้เลย การปวดข้อจะเป็นอยู่ประมาณ 1-12 สัปดาห์



คนที่เสี่ยง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีสิทธิ์เป็นโรคนี้ได้ทุกคน

การป้องกัน นอนในมุ้ง ป้องกันยุงกัด กำจัดลูกน้ำยูงลาย

### อสม. ต้องทำอะไรบ้าง

เฝ้าระวังในหมู่บ้าน ถ้ามีคนเดินทางกลับจากภาคใต้หรือจังหวัดที่มีการระบาดของโรค ให้สอบถามอาการทุกวันเป็นเวลา 12 วัน ถ้าพบอาการสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย หรือแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที



**อย่าลืม !!** รมรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และลูกน้ำยูงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

สามารถป้องกันได้ทั้งโรคไข้ปวดข้อยูงลาย (ชิคุนกุนยา) และโรคไข้เลือดออก

ด้วยความปรารถนาดีจาก กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข