


สถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 สัปดาห์ที่ 11 ปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2565)

การวิเคราะห์สถานการณ์ใช้ข้อมูลสะสมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1- 10 (วันที่ 1 มกราคม – 12 มีนาคม 2565) เขตสุขภาพที่ 9 ได้รับรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังร.506 จากเครือข่าย 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต

10 อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด

10 อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อากาศอูจจาระร่วง 165.26 ต่อประชากรแสนคน โรคปอดบวม 35.47 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ 33.58 ต่อประชากรแสนคน โรคอาหารเป็นพิษ 25.91 ต่อประชากรแสนคน โรคตาแดง 6.18 ต่อประชากรแสนคน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5.44 ต่อประชากรแสนคน โรคสุกใส 2.55 ต่อประชากรแสนคน โรคไวรัสตับอักเสบรวม 2.40 ต่อประชากรแสนคน โรคไข้หวัดใหญ่ 1.24 ต่อประชากรแสนคน และโรคเมลิออยด์ 0.87 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 10 อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

โรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 มีดังนี้

โรคซิฟิลิส ปี 2565 (วันที่ 13-19 มีนาคม 2565)

สถานการณ์โรคซิฟิลิส ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2565 มีผู้ป่วยโรคซิฟิลิส จำนวน 1,622 ราย อัตราป่วย 2.45 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.76 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 36.81 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 27.74 และกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี ร้อยละ 12.45 ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคกลาง 3.47 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ 2.51 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.73 ต่อประชากรแสนคน และภาคใต้ 1.59 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในประเทศ คือ จังหวัดเชียงราย อัตราป่วย 9.32 ต่อประชากรแสนคน

สถานการณ์โรคซิฟิลิสเขตสุขภาพที่ 9


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วย 131 ราย อัตราป่วย 1.93 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:1.11 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 6.12 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 5.05 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 25-34 ปี อัตราป่วย 3.56 ต่อประชากรแสนคน ดังรูปที่ 1

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคซิฟิลิสปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) พบความผิดปกติของการเกิดโรค โดยมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ปี 2565 ดังรูปที่ 2


จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคซิฟิลิสสูงสุดคือ จังหวัดบุรีรัมย์ 3.38 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ 2.28 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดนครราชสีมา 1.66 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดสุรินทร์ 0.50 ต่อประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคซิฟิลิสระดับอำเภอ พบว่าอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อำเภอขานิน จังหวัดบุรีรัมย์ 22.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 13.17 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 10.38 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ข้อเสนอแนะ

1. ขยายความครอบคลุมและเพิ่มความต่อเนื่องในการสื่อสาร การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันโรคในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
2. รมรคให้ความรู้และส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงบริการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และรับการตรวจเลือดหาโรคซิฟิลิส ได้ 2 ครั้ง ต่อการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง
3. ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่พบโรคซิฟิลิส และสามีหรือคู่นอนให้ได้รับการรักษาอย่างทันทั่วทั้งที่ เนื่องจากซิฟิลิสเป็นโรคที่รักษาหายด้วยยาเพนนิซิลิน ทำให้สามารถป้องกันการถ่ายทอดซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกได้
4. ดำเนินการเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์โรคซิฟิลิสอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะซิฟิลิสแต่กำเนิด (Congenital syphilis) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ทั้งการติดเชื้อก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์ โดยอาจมีภาวะแทรกซ้อนต่อการตั้งครรภ์และต่อทารกสูง



รูปที่ 1 แผนภูมิอัตราป่วยโรคซิฟิลิสต่อประชากรแสนคน ตามกลุ่มอายุ ปี 2565



รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคซิฟิลิสจำนวนรายสัปดาห์เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (2560-2564)


ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคซิฟิลิส ปี 2565 และปี 2564 ช่วงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

จังหวัด	ปี 2565 (1 ม.ค.-12 มี.ค. 65)		ปี 2564 (1 ม.ค.-12 มี.ค. 64)		อัตราป่วย ปี 65/64 (เท่า)
	Pt. (ราย)	อัตรา ป่วย*	Pt. (ราย)	อัตรา ป่วย*	
บุรีรัมย์	54	3.38	56	3.51	0.96
ชัยภูมิ	26	2.28	22	1.93	1.18
นครราชสีมา	44	1.66	73	2.76	0.60
สุรินทร์	7	0.50	36	2.58	0.19

หมายเหตุ * อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ตารางที่ 2 อัตราป่วยโรคซิฟิลิสสูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2565 เขตสุขภาพที่ 9

อัตราป่วยสะสม 10 อันดับแรก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2565				
ลำดับ	อำเภอ	จังหวัด	Pt.ราย	อัตราป่วย*
1	ขานิน	บุรีรัมย์	8	22.60
2	นางรอง	บุรีรัมย์	15	13.17
3	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	4	10.38
4	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	4	9.95
5	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	2	7.94
6	ปักธงชัย	นครราชสีมา	7	6.02
7	ละหานทราย	บุรีรัมย์	4	5.42
8	ครบุรี	นครราชสีมา	5	5.19
9	ปราสาท	สุรินทร์	7	4.59
10	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	8	4.39



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคซิฟิลิส ปี 2565 จำนวนรายอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9

โรคสุกใสปี 2565 (วันที่ 13-19 มีนาคม 2565)

สถานการณ์โรคสุกใสประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วยโรคสุกใส 1,090 ราย อัตราป่วย 1.65 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.07 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี ร้อยละ 18.15 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี ร้อยละ 14.76 และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี ร้อยละ 12.92 ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 2.08 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.93 ต่อประชากรแสนคน ภาคใต้ 1.70 ต่อประชากรแสนคน และภาคกลาง 0.97 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในประเทศคือ จังหวัดแพร่ อัตราป่วย 10.58 ต่อประชากรแสนคน

สถานการณ์โรคสุกใสเขตสุขภาพที่ 9


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วย 173 ราย อัตราป่วย 2.55 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.04 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 9.09 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 6.44 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 3.70 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังรูปที่ 1

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคสุกใสปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) ไม่พบว่ามีความผิดปกติของการเกิดโรค จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน ดังรูปที่ 2


จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคสุกใสสูงสุดคือ จังหวัดบุรีรัมย์ 4.89 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ 2.72 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดนครราชสีมา 1.55 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดชัยภูมิ 1.41 ต่อประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคสุกใสในระดับอำเภอ พบว่าอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 12.25 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 11.62 ต่อประชากรแสนคน อำเภอขาม จังหวัดบุรีรัมย์ 11.30 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ข้อเสนอแนะ

1. เฝ้าระวังโรคสุกใสในชุมชนและสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เรือนจำและทัณฑสถาน เป็นต้น และสอบสวนโรคผู้ป่วยสุกใสทุกราย
2. โรคสุกใสสามารถติดต่อได้ง่ายจากการหายใจ การสัมผัส จึงควรแยกเด็กป่วยออกจากเด็กคนอื่น ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวปะปนกัน และให้เด็กหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
3. กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ได้แก่ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด ผู้ที่กินยากกดภูมิต้านทาน ทารกแรกเกิด สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
4. การป้องกันโรคสามารถทำได้ด้วยการพาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคสุกใส โดยแพทย์แนะนำให้เริ่มฉีดตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป (วัคซีนนอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)



รูปที่ 1 แผนภูมิอัตราป่วยโรคสุกใสต่อประชากรแสนคน ตามกลุ่มอายุ ปี 2565



รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคสุกใสจำแนกรายสัปดาห์เปรียบเทียบข้อมูลปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564)


ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคสุกใส ปี 2565 และปี 2564 ช่วงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

จังหวัด	ปี 2565 (1 ม.ค. - 12 มี.ค. 65)		ปี 2564 (1 ม.ค. - 12 มี.ค. 64)		อัตราป่วย ปี 65/64 (เท่า)
	Pt. (ราย)	อัตรา ป่วย*	Pt. (ราย)	อัตรา ป่วย*	
บุรีรัมย์	78	4.89	221	13.85	0.35
สุรินทร์	38	2.72	148	10.59	0.26
นครราชสีมา	41	1.55	314	11.86	0.13
ชัยภูมิ	16	1.41	137	12.04	0.12

หมายเหตุ * อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ตารางที่ 2 อัตราป่วยโรคสุกใสสูงที่สุด 10 อันดับแรก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2565 เขตสุขภาพที่ 9

อัตราป่วยสะสม 10 อันดับแรก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2565				
ลำดับ	อำเภอ	จังหวัด	Pt.ราย	อัตราป่วย*
1	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	27	12.25
2	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	4	11.62
3	ขาม	บุรีรัมย์	4	11.30
4	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	3	9.29
5	นางรอง	บุรีรัมย์	9	7.90
6	จอมพระ	สุรินทร์	2	6.80
7	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	4	6.65
8	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	2	6.42
9	ลำดวน	สุรินทร์	5	6.00
10	โชคชัย	นครราชสีมา	2	5.72



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคสุกใส ปี 2565 จำแนกรายอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9

โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 (วันที่ 13-19 มีนาคม 2565)

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 มีนาคม 2565 มีผู้ป่วย 869 ราย อัตราป่วย 1.31 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.95 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 1 ปี ร้อยละ 10.82 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 10.59 และอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 8.86 ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคเหนือ 3.05 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.29 ต่อประชากรแสนคน ภาคใต้ 1.13 ต่อประชากรแสนคน และภาคกลาง 0.50 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในประเทศ คือ จังหวัดเชียงราย อัตราป่วย 9.24 ต่อประชากรแสนคน

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เขตสุขภาพที่ 9

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วย 57 ราย อัตราป่วย 0.87 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.27 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 5.39 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 1.61 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 1.39 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับดังรูปที่ 1

เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) ไม่พบความผิดปกติของการเกิดโรคเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2564 ดังรูปที่ 2 และทุกจังหวัด ณ สัปดาห์ที่ 5 มีค่าสัดส่วน ILI ต่ำกว่าร้อยละ 5 ดังรูปที่ 3 (ไม่มีข้อมูลในระบบ ILI ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6)

จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 1.32 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ 0.81 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดสุรินทร์ 0.57 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดชัยภูมิ 0.26 ต่อประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ระดับอำเภอ พบว่าอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 9.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 9.48 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 6.19 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ข้อเสนอแนะ

1. โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวิธีการป้องกันและวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยต่ำแต่มีอัตราป่วยตายสูง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวด้วยโรคเรื้อรังซึ่งไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
2. เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการ ILI โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคไข้หวัดใหญ่ต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย Rapid test และให้ยา Oseltamivir
3. ในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่นและแออัด เช่น เรือนจำ ค่ายทหาร โรงเรียน การเข้าค่ายพักแรม ควรมีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หากพบผู้ป่วยต้องมีการแยกผู้ป่วย โดยให้แยกห้องนอนหรือหยุดเรียนหยุดงาน
4. เมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะต้องดำเนินการสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่
5. ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตต้องมีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันเชื้อก่อโรคทุกราย (รวมทั้ง Rapid test)


ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2565 และปี 2564 ช่วงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

จังหวัด	ปี 2565 (1 ม.ค. -12 มี.ค. 65)		ปี 2564 (1 ม.ค.-12 มี.ค. 64)		อัตราป่วย (เท่า)
	Pt. (ราย)	อัตราป่วย*	Pt. (ราย)	อัตราป่วย*	
นครราชสีมา	35	1.32	150	5.67	0.23
บุรีรัมย์	13	0.81	187	11.72	0.07
สุรินทร์	8	0.57	111	7.94	0.03
ชัยภูมิ	3	0.26	36	3.16	0.08


หมายเหตุ * อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ตารางที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2565 เขตสุขภาพที่ 9

อัตราป่วยสะสม 10 อันดับแรก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2565					
ลำดับ	อำเภอ	จังหวัด	Pt. ราย	อัตราป่วย*	
1	ชุมพวง	นครราชสีมา	8	9.65	
2	ละหานทราย	บุรีรัมย์	7	9.48	
3	นาโพธิ์	บุรีรัมย์	2	6.19	
4	หนองหงส์	บุรีรัมย์	2	4.00	
5	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	5	3.70	
6	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1	3.32	
7	รัตนบุรี	สุรินทร์	3	3.25	
8	บ้านด่าน	บุรีรัมย์	1	3.24	
9	พิมาย	นครราชสีมา	4	3.12	
10	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	1	2.59	




รูปที่ 1 แผนภูมิอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ต่อประชากรแสนคน ตามกลุ่มอายุ ปี 2565




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกรายสัปดาห์เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 และปี 2564 ช่วงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด



รูปที่ 3 สัดส่วน ILI ต่อผู้ป่วยนอก แยกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ปี 2565 หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูลในระบบ ILI ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกรมการคล้ายไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565



รูปที่ 4 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 จำแนกรายอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9

โรคปอดบวม ปี 2565 (วันที่ 13-19 มีนาคม 2565)

สถานการณ์โรคปอดบวม ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 7 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วย 18,677 ราย อัตราป่วย 28.23 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 23 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.78 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 37.85 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี ร้อยละ 14.04 และกลุ่มอายุ 45-54 ปี ร้อยละ 10.14 ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคเหนือ 31.59 ต่อประชากรแสนคน ภาคใต้ 24.33 ต่อประชากรแสนคน และภาคกลาง 16.16 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในประเทศ คือ จังหวัดเชียงราย อัตราป่วย 96.73 ต่อประชากรแสนคน

สถานการณ์โรคปอดบวม เขตสุขภาพที่ 9

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 12 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วย 2,400 ราย อัตราป่วย 35.41 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:1.20 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 129.01 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 110.49 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 55-64 ปี อัตราป่วย 38.72 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ ดังรูปที่ 1

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2560 - 2564) ไม่พบความผิดปกติของการเกิดโรค โดยมีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ดังรูปที่ 2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคปอดบวมสูงสุดคือ จังหวัดชัยภูมิ 39.54 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ 38.64 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดบุรีรัมย์ 35.17 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดนครราชสีมา 32.14 ต่อประชากรแสนคน รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคปอดบวมในระดับอำเภอ พบว่าอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 238.00 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ 169.38 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอดำรงวิทยารมย์ จังหวัดสุรินทร์ 135.57 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมจากไข้หวัดใหญ่ควรให้ยาต้านเชื้อไวรัส
2. หลังจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียควรรักษาด้วยยาปฏิชีวนะอย่างรวดเร็วที่สุด
3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็ก ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคประจำตัวบางอย่าง การฉีดวัคซีนที่ให้ผลในการลดอัตราการเกิดโรคปอดบวมจากการติดเชื้อได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
4. อาการปอดบวมเป็นอาการที่พบได้จากหลายโรค ควรทำการตรวจหาเชื้อก่อโรค โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมจำแนกรายสัปดาห์ที่เปรียบเทียบข้อมูลปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (2560-2564) ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคปอดบวม ปี 2565 และปี 2564 ช่วงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

จังหวัด	ปี 2565 (1 ม.ค. - 12มี.ค. 65)		ปี 2564 (1 ม.ค. - 12มี.ค. 64)		อัตราป่วยปี 65/64 (เท่า)
	Pt. (ราย)	อัตราป่วย*	Pt. (ราย)	อัตราป่วย*	
ชัยภูมิ	450	39.54	875	62.62	0.62
สุรินทร์	540	38.64	699	61.42	0.64
บุรีรัมย์	561	35.17	1,360	85.25	0.41
นครราชสีมา	851	32.14	1,278	48.27	0.67

หมายเหตุ * อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ตารางที่ 2 อัตราป่วยโรคปอดบวม สูงที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2565 เขตสุขภาพที่ 9

อัตราป่วยสะสม 10 อันดับแรก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2565				
ลำดับ	อำเภอ	จังหวัด	Pt.ราย	อัตราป่วย*
1	นางรอง	บุรีรัมย์	271	238.00
2	นีนสง่า	ชัยภูมิ	44	169.38
3	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	183	135.57
4	ขำนิ	บุรีรัมย์	42	118.66
5	ชุมพวง	นครราชสีมา	92	110.99
6	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	41	106.34
7	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	35	101.71
8	ละหานทราย	บุรีรัมย์	57	77.20
9	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	83	74.33
10	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	131	71.85



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคปอดบวม ปี 2565 จำแนกรายอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9

โรคไข้หัด ปี 2565 (วันที่ 13-19 มีนาคม 2565)

สถานการณ์โรคไข้หัด ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วยโรคไข้หัด 56 ราย อัตราป่วย 0.08 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1:0.40 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.14 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 45-54 ปี ร้อยละ 25.00 และกลุ่มอายุ 55-64 ปี ร้อยละ 17.86 ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 0.17 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.11 ต่อประชากรแสนคน ภาคใต้ 0.08 ต่อประชากรแสนคน และภาคกลาง 0.01 ต่อประชากรแสน ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในประเทศคือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วย 0.80 ต่อประชากรแสนคน

สถานการณ์โรคไข้หัด เขตสุขภาพที่ 9


ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 มีนาคม 2565 พบผู้ป่วย 24 ราย อัตราป่วย 0.35 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1:3.80 พบมากที่สุดในกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี อัตราป่วย 0.95 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี อัตราป่วย 0.70 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 45-54 ปี อัตราป่วย 0.55 ต่อประชากรแสนคน ดังรูปที่ 1

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หัดปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) พบว่ามีควมผิดปกติของการเกิดโรค ปี 2565 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 41 ปี 2564 พบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน ดังรูปที่ 2


จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้หัดสูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 0.87 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ 0.09 จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ไม่พบผู้ป่วย รายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคไข้หัดในระดับอำเภอพบว่าอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 5.55 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 4.83 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 3.62 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการสอบสวนให้ทราบพฤติกรรมการบริโภค แหล่งที่มาของเนื้อหมู และศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาชนิดของเชื้อภายในจังหวัดและเขตร่วมกับทีมปศุสัตว์
2. สื่อสารความเสี่ยงโรคไข้หัดให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้มีการปรับพฤติกรรมบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงสุก ไม่ควรรับประทานเนื้อหมูดิบร่วมกับการดื่มสุรา
3. ประชาชนควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ไม่ควรซื้อจากแหล่ง ที่ไม่ทราบที่มาของหมู
4. ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ขายและหมู พัฒนามาตรฐานของฟาร์มหมู โรงฆ่าสัตว์ เชียงหมู ให้ความความปลอดภัยต่อผู้บริโภค



รูปที่ 1 แผนภูมิอัตราป่วยโรคไข้หัดต่อประชากรแสนคน ตามกลุ่มอายุ ปี 2565



รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หัดจำนวนรายสัปดาห์เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2565 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564)


ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราป่วยโรคไข้หัด ปี 2565 และปี 2564 ช่วงเวลาเดียวกันแยกรายจังหวัด

จังหวัด	ปี 2565 (1 ม.ค.-12 มี.ค. 65)		ปี 2564 (1 ม.ค.-5 มี.ค. 64)		อัตราป่วย ปี 65/64 (เท่า)
	Pt. (ราย)	อัตรา ป่วย*	Pt. (ราย)	อัตรา ป่วย*	
นครราชสีมา	23	0.87	8	0.30	2.90
ชัยภูมิ	1	0.09	1	0.09	1.00
บุรีรัมย์	0	0.00	1	0.07	0.00
สุรินทร์	0	0.00	0	0.00	0.00

หมายเหตุ * อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ตารางที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้หัด สูงที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2565 เขตสุขภาพที่ 9

อัตราป่วยสะสม 10 อันดับแรก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 12 มี.ค. 2565				
ลำดับ	อำเภอ	จังหวัด	Pt.ราย	อัตราป่วย*
1	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	2	5.55
2	ชุมพวง	นครราชสีมา	1	4.83
3	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	3	3.62
4	โนนสูง	นครราชสีมา	4	3.32
5	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา	1	3.20
6	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	1	2.71
7	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	1	2.32
8	บำเหน็จณรงค์	ชัยภูมิ	1	1.90
9	ประทาย	นครราชสีมา	1	1.29
10	คง	นครราชสีมา	1	1.26



รูปที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หัด ปี 2565 จำนวนรายอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9

นางสาวชุตินมชนม์ สิงห์เขียว

นายแพทย์ปฏิบัติการ/ผู้จัดทำ

นางนันทนา แต่ประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/ผู้ตรวจทาน